

瘍

醫

大

全

萬醫大全目錄

卷三十三

痘疹部

痘疹門主方

痘疔門主論附方

痘癰門主論附方

痘疳門主論附方

痘風瘡門主論附方

痘瘰癧門主論

痘後癰跡不退門主論

痘後瘡收不乾門主論

出痘後細瘡如疥難愈論

精炮製用藥法

四万疹名各別

羅田萬密齋碎金賦

聶氏痧疹論

麻疹同附方

瘍醫大全卷三十三

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東鄉
男 櫛焚用和 全校

痘疹部

白痘疹主治諸方以及痘疔痘癰皆彙於此部中以
便檢閱參治

痘疹門主方

大熱見痘大小便紅血熱甚者 四公一百三方

當歸

白芍

牛蒡子

升麻

黃連

熟地

枳殼

山梔

地骨皮

木通

水煎服

痘上面收完足下收遲聲音不曉

天花粉

桔梗

甘草

柯子肉

防風

陳皮

白茯苓

葛根

石膏

燈心引煎

痘滿面連肉一片紅者

升麻

少許

陳皮

紫草

紅花

枳殼

甘草

黃連

炒

黃芩

炒

生地

木通

蘇木

水煎服

痘頂陷稠密者

人參

桔梗

川芎

白茯苓

白朮土炒

甘草

白芷

生黃芪

紫草

防風

穿山甲炮

水煎服

痘內中有大紫泡者

紅花

淫羊藿

白朮

白羊糞

甘草

水煎服

痘口鼻中並出蛔虫者

防風

當歸

黃連

直僵蠶

木通

熟地

牡蠣

牡丹皮

水煎服

痘飲食挫喉痰涎盛者

桔梗

熟地

防風

陳皮

川貝母

麥門冬

瓜瓊仁

厚朴

北五味

杏仁

牛蒡子

天花粉

水煎服

外用山豆根磨水漱口

痘灰白全無血色者

人參

白朮

當歸

甘草

黃芪

白芍

熟地

肉桂

川芎

穿山甲

炮

水酒各半煎服

痘泄瀉不止者

人參

白朮

廣木香

磨汁

訶子肉

麥門冬

肉荳蔻

麪包煨
去油

烏梅

棗引煎加人牙煨乳酒調服

痘胸腹脹悶亂氣促者

赤茯苓

川芎

當歸

熟地

山查肉

麥門冬

檳榔

枳實

木通

枳殼

木通

大腹皮

澤瀉

水煎服

痘初出血點皮內白者

生地

黃連炒

枳殼

牡丹皮

陳皮

紫草

木通

川芎

甘草

棗引煎半熟時加當歸

痘黑陷成斑摸不得手者

升麻

紫草

陳皮

牛蒡子

熟地

枳殼

紅花

穿山甲

黃荳四十粒

生地

糯米引煎服

痘白首至尾熟不除者

地膚子

連翹

當歸

柴胡

地骨皮

甘草

牛蒡子

柴胡

前胡

防風

紫草

黃芩

石膏

水煎服

痘遍身作癰者

人參

川芎

生地

何首烏

白芍

潘羊霍

黃芪

穿山甲

白茯苓

薑棗引煎服

如不止宜爆燈火

痘後泄瀉不止者

人參

白茯苓

白朮

廣木香

川芎

白荳蔻

肉桂

訶子肉

山藥

香附

薑棗引煎服

痘狂亂語言不正者

人參

遠志肉

茯神

天門冬

山查

石菖蒲

燈心十四根水煎服

若還不愈用滑石辰砂各三分水片五厘燈心湯服

痘將收靨遍身黑陷膿臭濕爛者

防風

羌活

桔梗

荊芥

柴胡

黃柏

木通

甘草

水煎服

痘如十二三朝不能靨者

人參

何首烏

黃芪

各一錢

水煎入象牙

炒黃色一錢研調服

痘初起吐瀉不止者

陳皮

半夏

直僵蠶

山查

白茯苓

黃荳

七粒

薑棗引煎服

痘初出大熱稠密半隱肌膚者

牛蒡子

防風

升麻

白朮

白芍

水煎服

又方

荷葉

絲瓜襖

麻黃

肉桂

甘草

紫草

蟬蛻

水煎服

神燈照

解痘厭轉凶為吉歌

痘不起兮怎奈何我有神燈通竅多照動乾坎方為

主火照天庭太陽窩一日三次周流照其痘中開定發窠此法上仙留下世醫家少會照沉痾

柴草

上上

白芷

上

沉香

中

北細辛

中

三奈

中

乳香

中

檀香

中

肉桂

下

共乳細末將藥捲入紙條內用麻油黃蠟各五錢熬化將藥撚拖之燃照痘兒面部周身一日數照以解其厭

異功散

治痘風寒滋氣血和陰陽救表裏

人參

廣木香

陳皮

肉苳蔻

官桂

白茯苓

當歸

熟附子

厚朴

母丁香

半夏

白朮

薑棗引煎服

若還用之不當
只消一服即亡

小異功散

治痘喘嗽

人參

麥門冬

杏仁

北五味

陳皮

白朮

水煎服

溫中湯

治痘三朝身涼不渴口氣冷痘淡白二便清利

陳皮

厚朴

人參

白茯苓

黃芪

官桂

半夏

當歸

川芎

熟地

薑引煎服

泄瀉加白朮澤瀉再不止加訶子

肉苁蓉能保脾胃助氣血數劑必灌稠漿

托裏湯

人參

黃芪

當歸

防風

青皮

生地

水煎服

痘不起速服莫待痘苗枯

內托均氣散 十二仙方

治痘初熱

蘇葉 八分

乾葛 七分

廣木香 六分

黃芪 川芎

甘草 各五分

桔梗 四分

白芍

紫草 各三分

筍七片引煎服

蘇發散

治小兒感冒傷寒傷風咳嗽流涕

蘇葉

陳皮 各一錢

蒼朮

甘草各七分 厚朴 枳殼各三分

葱引煎服

灌膿起頂湯

治痘不起發

人參七分 黃芪二錢 白芷

甘枸杞各一錢 淫羊藿 川芎

甘草各五分 黃荳七粒

薑棗引煎服

結廕散

治痘不收作癰

白芷一錢

何首烏七分

川芎

甘草

各五分

木通

蟬

蛻各三分

白朮

荷

葉

各二分

水煎服

堅腸湯

治痘泄瀉

黃芪

白朮

肉苁蓉

各一錢

山查肉

七分

川

芎

五分

升

麻

三分

棗引煎服

鎮胃散

治痘嘔吐不止

藿香

砂仁

白朮

薑棗糯米七粒引煎服

利咽散

治痘咽喉疼痛難進飲食

山豆根一錢

桔梗七分

甘草一分

元參

一分五厘

萊菔十粒

水煎服

通腸湯

治痘大小便秘結如神

黑芝蔴 三錢

大黃

滑石

枳

殼 各一錢

當

歸 五分

萊菔

七粒

水煎服 加牛膝一錢引經易下

滑利散

治痘小便不通

木

通 三分

赤茯苓 七分

澤

瀉 五錢

燈

心

根二十

水煎服

定疼散

治痘肚疼或冷氣

神麴

山查

當歸

熟附子

良薑

甘草

棗引煎服

斬關散

治痘鼻血不止

生地

牡丹皮

黃芩

各五分

茅根

升麻

藕節

各三錢 一錢

棗莖五十粒引煎服

奪命丹

治小兒風搐痰氣急慢二驚如神

西牛黃

青黛

甘草

各一錢

鬱金

明天麻

白僵蠶

白附子

全蝎

去頭足

茯神

蟬蛻

去頭足

陳膽星

各二錢

鈎藤鈎

桔 梗

硃

砂 各五分

研細蜜丸芡實大金箔三十張爲衣每服一丸

金銀花煎湯調服

神驗稀痘丹

預服可免痘瘡

絲瓜蒂

燒存性 五錢

西牛黃 一錢

辰

砂

七分

蟬

酥 乳化 二錢

共爲細末一歲一分砂糖湯調服

大解散

黃芪

羌活各二錢

赤芍藥

桔梗各七分

白芷

黃連

甘草各五分

地膚子

川芎各三分

明天麻二分

水煎服

紫草透肌湯

紫草二錢

防風

荊芥

薄荷

山查肉

梔子

甘草各等分

水煎服

笑逢散

山梔仁

蟬

蛻各等分

水煎服

七貞湯

治痘二三日可服

升麻

六錢

川芎

五分

甘草

三錢

薄荷

八分

淫羊藿

一錢

穿山甲

土炒二片

水煎服

牙托散

人牙人乳製麝香過一個二分

研細生酒調服

拔疔丹

治痘疔

雄黃 硃砂 白芷各等分

乳細油臘脂調用銀針挑破搽之

實腸湯

治痘泄瀉

白 朮 一土砂錢 赤石脂 五分 甘 草 四分

龍 骨 三分 枯 礬 二分

水煎服

淫羊補漿湯

治痘不灌漿

淫羊藿 人 參 白 朮 土炒

穿山甲 炮各二錢 防 風 生 地

甘 草 川當歸 黃 蘗 炒各三錢

官 桂 廣木香 川 芎



白芷

陳皮

各一錢

白茯苓

黃芪

各五分

糯米

五錢

竹筍煎汁當水煎不拘時服

益氣收漿湯

治痘不收靨

何首烏

白芍

黃芪

桔梗

各二錢

人參

七分

白朮

三錢

陳皮

砂仁

甘草

各一錢

山查肉

一錢二分

米泔水煎服

升天散

杏仁

防風

甘草

麻黃

梔子

乾葛

乾姜

各五分

水煎服

升麻劑

升麻

肉桂

猪苓

澤瀉

白茯苓

黃芪

甘草

各等分

烏梅

一個

水煎服

清血退心湯

麻黃

山梔

官桂

薑黃

蒲黃

木通

連翹

甘草

各等分

水煎服

獨活消痰飲

半夏

天南星

乾葛

羌活

木通

甘草

各等分

水煎服

解毒散

黃芩

梔子

連翹

烏梅

蘇薄荷

甘草

各等分

水煎服

開關散

直僵蠶

炒去絲一錢

量加

陳膽星

麝香

各二分

煎服

陰陽湯

黃芪

白茯苓

白朮

山查肉

甘草

木通

砂仁

杏仁

各等分

水煎服

化積止痢湯

神麴

廣木香

檳榔

黃連

砂仁

麥芽

水煎服

敗毒清涼飲

防風

白芍

白朮

羌活

黃芪

獨活

杏仁

甘草

梔子

各等分

水煎服

水楊柳湯

水楊柳

春冬用根秋夏用枝葉五觔

水一大鍋煎五六沸先用數杓於木盆內以手

探試不可太熱慢慢添湯洗之拭乾然後以神

湯醫大全
燈照其週身如陷塌處有暈脚起系便是漿影也後必滿足倘若不滿足又如前法洗之如虛弱者只洗頭面四肢若洗照不起發者則津液枯槁難治矣

四味升葛湯

治痘三日前後可用

升麻

葛根

芍藥

甘草

水煎服

和勸湯

升麻

葛根

芍藥

甘草

人參

川芎

羌活

防風

各等分

水煎服

四配清中飲

治痘七日前可用

當歸

芍藥

甘草

大黃

水煎服

解毒三賢飲

治痘十四日前後用

鼠粘子

荆芥

甘草

水煎服

連翹飲

治痘十四朝用

連翹

荆芥

芍藥

鼠粘子

當歸

木通

防風

滑石

瞿麥

車前子

蟬蛻

梔子

黃芩

柴胡

甘草各等分

水煎服

參蘇飲

人參

紫蘇葉

半夏

陳皮

甘草

前胡

桔梗

枳殼

乾葛各等分

水煎服

四苓湯

止水瀉

猪苓

白茯苓

澤瀉

白米

水煎服

白螺散

治痘不收靨

古土墻上白螺螄殼洗淨煨乳細末乾摻

金華散

方書大全卷之五 痘疹 手 顧氏秘傳

治痘後肥瘡疳瘡疥癬能涼肌解毒收水

黃丹

黃栢

黃芪

黃連

大黃

輕粉

麝香

共乳細濕瘡乾摻燥瘡熬猪油調搽

加味平胃散

治小兒吐乳吐食泄瀉傷寒等症

蒼朮

八分

芍藥

一錢

白朮

神麴

陳皮

厚朴

各五錢

白芷

甘草各三分

右爲細末人參湯調服

吐瀉相兼用木香湯下
飲食不思山查湯下
煩躁口渴麥冬湯下
二便不利木通湯下
夜間啼哭元胡青皮湯下
諸般雜症
米湯下
肚痛不止芍藥花粉湯下

四仙湯

此爲治痘之主宰而君臣佐使出入加減全在

慧心

潘羊霍

陳皮

天門冬

甘草

薑三片棗三枚水一鍾煎七分服

痘壯寒渴泄氣促加天花粉二分白茯苓三分
痘身熱見紅糞加牡丹皮赤芍黃芩黃連甘草
痘身熱大小便不利加木通燈草
痘身熱暴躁心神不安加棗仁黃芩天冬各三錢
痘根寒不紅加人參白朮黃芩人牙爲佐
痘不紅潤加人參白朮當歸木香地黃
痘前後吐瀉加白朮藿香白芷薤
痘泄瀉不止小便不利加白芷薤陳皮訶子白芍
痘飲食挫喉加桔梗貝母殭蠶麝香
痘咬牙寒戰加附子桂枝丁香少許
痘口裂加生地天門冬枯芩白茯苓葛根
痘初熱驚風加蠶蠶天麻烏梅硃砂
痘只咬牙加人參丁香三粒
痘頂陷加紫草蟬蛻去頭足糯米四十九粒
痘頭足冷加附子二片廣木香二分
痘手冷加附子乾薑各三分

痘鼻流清涕加蘇葉桔梗各一錢

痘泄瀉加訶子肉桂麥冬

痘痰壅嘔吐加藿香生薑各五分杏仁三分

痘鼻中出血加犀角赤芍生地天門冬

痘汗出不乾加黃芪一錢浮小麥四十粒

痘初出遍身黑色者加丁香一粒陳皮白朮砂仁

痘唇口相連者加麥冬梔子酒炒用

痘前後舌疼者加麥冬石膏知母

痘大小便秘結加木通燈心車前子

痘手足拘攣加木瓜牛膝桑寄生量日期加減

痘牙黑加黃連香白芷

痘發疔毒加荆芥梔子牛蒡子

痘後失音加訶子皮桔梗麥冬五味子

痘後夜啼加麥冬青皮生地茯神硃砂

痘後中風不語加天南星天麻辰砂春秋加麥冬

五味子

痘後腰痛加地膚子破故紙量日期加此二味

痘吐蛔虫加附子一片丁香一箇人參二分再將

婦人燒灰共研細末和服
孕婦忌加苧根砂仁各五分

和中散

白朮

陳皮

錢各一

人參

藿香

白茯苓

甘草

砂仁

各五分

半夏

八分

薑引煎服

托裏千金散

人參

當歸

錢各一

廣木香

厚朴

甘草

香

附

各五分

川

芎

白芍藥

各七分

白

芷

八分

桔

梗

四分

糯

米

四十粒

雞汁一鍾笋二兩煎服

初發熱痘未出者

升麻

紫草

紫蘇

白芍

酒炒

牛蒡子

甘草

山查

芎白一根煎服如表之仍不出其痘勢重可加

敗毒散一歲用一分

稀痘湯

看耳後紅筋枝葉者乃兩經齊發未出者

升麻

葛根

芍藥

甘草

各等分

水煎服 如一經發者加牛蒡子

單胎法

妊婦出痘先護其胎後再治痘

人參

白朮

當歸

枳殼

赤茯苓

甘草

陳皮

防風

白芍

條芩

荊芥

桔梗

紫草

赤芍

白芷

柴胡

葛根

阿膠

一

砂仁

懷山藥

川芎

糯米

各等分

乾柿蒂

七個

野苧根

七寸

甜瓜蒂

一個

金器一件爲引入罐內以薄荷葉封口煎空心

服如大熱加鬱金

換痘法

服之壞痘換為好痘卽痘之狼狽時亦可服

穿山甲

先以紫草汁煮過再用甘草汁煮過焙乾研細每用一兩

綠萼梅

淨洗六錢

西牛黃

麝

香

各分許

共乳細末磁瓶密貯年長者每服八九分小者服五六分俱用萊豆赤豆黑豆芡薏煎湯服

救痘不灌漿一服卽灌

粉甘草不拘多少切片入青竹筒內上留一孔以竹針塞住外以荷葉油紙包紮數層冬至日放入

湯醫大全
五
糞坑內至春取起陰乾掛風頭每用三錢研細以
參朮湯調下卽發臭汗一身其漿卽灌

換痘法

大田螺三兩去殼取肉入麝香三分牛蒡子九分
搗爛用帛包裹數層放在痘兒臍上以熨斗熨臍
待其藥紙俱乾爲度大便出如黑糖之狀後用湯
藥一二服可也
湯藥方 乾葛白芍牛蒡子 槐花
檳榔甘草煎滾再投大黃服量人
虛實如何再用
紫草透肌湯

換痘法

白牛虱不拘多少入罐內以蠟固口放地上三日
人微火炙七次取出研末每次服一分薑湯調服
痘收氣將絕

胎元

人

牙

人乳製

鹿

牙

人乳製

雞蛋

黃芪

人

參

純陽草

白

朮

陳

皮

甘草

各等分

共乳細末用人乳全薑汁調灌卽刻回生
痘猶移之間初發熱之時用此爲主

荔枝肉

元眼肉

大棗

各七枚

糯米

七十粒

薑引煎服其痘即發出

化癰湯

痘瘡夾癰

黃連

何首烏

連翹

馬鞭草

木通

牡丹皮

蟬蛻

赤芍藥

山梔

片黃芩

桔梗

牛蒡子

紅花

白茯苓

紫草

生地

荆芥

防風

水煎服

如大癰口燥加石膏

初起夾癰加

葛根升麻浮小麥

初熱時可加純陽草

眼中生痘瘡急用此方

龍膽草

菊花

石決明

秦皮

甘枸杞

甘草

密蒙花

黃芩

木賊草

黃連

炒

萊豆殼

升麻

穀精草

當歸

白蒺藜炒去刺

猪肝四兩

純陽草

順流水煎服

牙疳落齒

落蘇蒂燒灰入蠶繭內以嫩松苗

近水邊生者

搗汁浸

透焙研細末搽之

痘時喘急火症

白花地丁三錢水煎服即解

三合散

治痘敗痰火盛

四君子湯四物湯二陳湯各等分煎服

犀角地黄湯

治痘血熱失血

生地

牡丹皮

白芍

各等分

水煎好磨犀角汁和服

甘桔湯

治痘咽喉腫痛

桔梗

三錢

甘草

一錢

煎服

生脉散

治痘後灰白氣血兩虧

人參一錢

炙黃芪三錢

煎服

四聖丸

痘後翳膜

兔糞四兩

家菊花二兩

白蒺藜

甘草各一兩

煉蜜爲丸桐子大每服三十丸菊花茶送下

四寶丹

治痘疔

珍珠 三分

豌豆灰

血

餘 各等分

冰片 五厘

共乳細以油蘸脂調成膏每以金銀簪刺破將膏填入瘡口卽刻紅活矣

痘瘡黑陷倒靨乾枯不起

蟬酥

冰片

各二分

西牛黃

一分

硃砂一錢

雄黃三分

共乳細將獺猪尾血一錢八分爲丸如小豇大薄荷湯服一丸卽刻生動矣

痘瘡壯熱大便秘塞

當歸

白芍

甘草各等分

煎服

大便不通

黃蜜熬至滴水成珠撚好小指細納入穀道內卽通如秘甚加猪牙皂角末和蜜條內導之或猪膽

汁皂角末裝葱管內塞入穀道內卽通

人虛痘不起漿

炙黃芪

二錢

人參

白朮

當歸

柴胡

升麻

陳皮

各一錢

甘草

五分

煎服

防痘傷目

用寧油

卽濟寧油
臘脂

塗眼眶上下卽免

痘隱不起欲令速出

芫荇子一升全酒煎不可泄氣待溫去渣除頭面
不可噴只從項下噴至前心後心手脚俱到噴後
包煖片刻卽現

稀痘百齡方

黑芝蔴

不拘多少

甜甘草

少許

煎服 初生小兒半小杯作三次服從洗三服
至百日週歲小兒至五歲每晚服一杯六歲至
九歲早晚各服一杯可保永不出痘矣

凡痘焦平黑陷全無生意

活公鷄一隻

約六觔以外者

山羊血一錢伴飯與鷄喫半

日後將雞去毛整煮化爲稠湯取一碗與乳母服之將乳與小兒喫再用甘草白芍各五分金汁一盃煎好入山羊血五分調服少刻痘卽轉紅活矣痘瘡火症全閉不出

取河底滋泥遍塗嬰兒身上半日後洗去卽有紅點現矣

痘漿半起臭爛者

當歸

大

黃

各五分

煎好調紫雪一分服

痘瘡喘吐

丁香

紫花地丁各一錢

全金銀露煎服即止

痘瘡大小二便秘燥黃赤者

赤芍一錢

黃連八錢

冰片三厘

研細開水沖服

痘漿不起

白牛頭上蝨約二十個

鏡臺後壁錢要有一個

• 用瓦焙乾再用白鐵雞冠血數匙酒釀數匙共入盞內用白鴿煨湯沖服即可起漿

痘瘡灰白下陷

取修脚皮一撮煎湯服即起

十神解毒湯

當歸稍酒洗

紅花酒洗

生地酒洗

丹皮

赤芍

桔梗

連翹

去心蒂研

木通

小川芎

大腹皮

洗淨薑汁拌晒各五分

水煎服

此方以涼血行血為主而佐以桔芎有開提發散之義引以腹通有疎利之能臣以丹翹有清解之良視古方純用寒涼冰伏熱毒者大不同痘已出未出二三日間煩悶燥渴小便赤澁睡卧不寧者可用之可與初發熱條敗毒和中散用參

九味神效散

治痘初出稠密紅紫或帶焦黑色者

人參

牛蒡子

黃耆

紫草茸

甘草

紅花

前胡

生地

白芍

各等分

水煎服

荆防解毒湯 治痘夾斑夾麻夾丹俱可用

防風 去蘆

荆芥穗

升麻 各四分

黃芩 酒炒

黃栢 酒炒

元參

牛薺子 炒 各六分

水煎服

四聖散

紫草

黃耆

甘草

木通 各一錢

水煎服

鼠粘子湯

柴胡

當歸身

連翹

牛蒡子炒研

黃芩酒炒

炙甘草

黃耆

地骨皮各等分

水煎服

保元湯

黃耆三錢

人參

甘草各一分

老生薑一片大棗一枚去核同煎有熱者黃耆甘草生用虛

者黃耆蜜炙甘草炒熟更加官桂五分

異攻散 治痘灰白癰塌咬牙寒戰泄瀉腹脹治虛寒證純陰無陽者

人參 白茯苓 白朮

當歸 陳皮 厚朴 薑汁炒

製半夏 丁香 肉蓯蓉 麩裹煨 熱去油

木香 熟附子 官桂

加薑棗水煎 先服去附子亦可若裏虛瀉甚又不可無附子

木香散 治虛寒證純陰無陽者

大腹皮 黑豆汁洗淨 人參 赤茯苓

前胡 柯子肉 半夏 姜湯泡洗七次

青皮

去穢炒

丁香

官桂

南木香

臨時酒磨入

甘草

各三分

生薑三片棗一枚去核煎如虛加黃耆糯米

回生丹 痘灰白虛寒吐瀉手足冷者可用此方應急

丁香

九枚

乾薑

一錢

水煎熱服

八正散

小便瀹秘服導赤散不效用此方

赤茯苓

篇蓄

山梔仁

瞿麥

車前子

木通

各八分

飛滑石 二錢 甘草 四分

燈心一團煎食前服熱盛大便秘者加大黃一錢

無價散 黑陷欲死者用此應急

用無病小兒糞陰乾將傾銀罐二個上下合定鹽泥固濟火煨通紅取出爲末蜜水調服一錢一方加麝香冰片少許

升麻葛根湯 解發痘疹良方

升麻 白芍藥 葛根

甘草各等分

水煎服

人參敗毒散

解疫癘發痘疹之良方又主腰痛四時通用

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

枳殼

桔梗

白茯苓

人

參各等分

甘草

減半

生薑三片溫服 一方有薄荷

柴葛敗毒散

疑似傷寒以此解發

柴胡

蘇葉

葛根

人參

羌活

防風

荊芥

甘草

桔梗

薑引

香蘇敗毒散

疑似傷食以此解發

香附

蘇葉

蒼朮

厚朴

青皮

甘草

山查肉

薑引

雙解散

痘瘡表裏俱實非此不解

防風

川芎

當歸

白芍

大黃

薄荷葉

連翹

各五分

石膏

桔梗

黃芩

各八分

桂枝

荊芥穗

各二分

滑石

二錢四分

甘草

一錢

薑引

消毒保嬰丹

纏荳藤

黃豆或紫豆梗上纏繞細紅線者是也八月間生烈日採之陰乾一兩五錢

黑大荳

三十粒

赤小荳

七十粒

新升麻

赤芍藥

各七錢五分

生地黄

酒浸焙

牛蒡子

炒

辰砂

另研水飛

山查肉

各一兩

荆芥

連穗

防風

去蘆

生甘草

川獨活

當歸

酒洗

黃連

去枝槓

桔梗

各五錢

老絲瓜

隔年經霜者二箇取連藤蒂五寸燒存性

右各研細和勻用淨沙糖丸如李核大每服一

丸濃煎甘草湯化下

其藥味預備須待春分秋分或正月十五日七月十五日十月十五日洒掃靜室至誠修合忌婦人戴孝服人猫犬見之合畢焚香叩齒日出時望東吸氣一口吹佈藥上向太陽密呪一

氣七通 呪曰神仙真藥體合自然嬰兒吞服天
地齊年吾奉 太上老君急急如律令 勅

代天宣化丸

嘉靖甲午春痘毒流行病死者什八九
乃一厄也時有預服三豆湯絲瓜辰砂

散及方書所載預解痘毒之法靡不用
之未見其效予竊思痘疹疫癘之毒因
歲運災毒之變難以藥解而人事未盡
又不可委之天數也於是檢閱古方乃
於韓氏醫通得五瘟丹以五運為主喜
曰此解毒神藥也依方修合施售與人
但服之者莫不輕疎人皆神之故名之

甘草

甲巳年

黃

苓

乙庚年

黃

蘗

丙辛年

山

梔

丁巳年

黃

連

戊癸年

連

翹

佐

牛蒡子

佐

山豆根

佐

先視其年所屬者爲君次四味爲臣君藥倍用
臣藥減半佐視臣又減半共爲極細末於冬至
日修合取雪水煮升麻汁打麴糊丸辰砂爲衣
竹葉煎湯下

快斑湯 治起發遲

人參 五分

當歸

防風

木

通 各一錢

甘草 三分

木香

紫草

蟬

蛻 各二分

水煎服

內托散

治氣血虛損或風穢冲觸使瘡毒內陷伏而不出或出而不勻快此活血勻氣調胃補虛內托使之盡出易收易屬

人參

黃耆

當歸

各二錢

川芎

桔梗

厚朴

薑汁炒

白芷

生甘草

各一錢

木通

肉桂

各三分

此方紅紫黑陷屬熱毒者去肉桂加紫草紅花黃芩若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏肉桂救表當貫而不貫者倍參耆當歸煎熟入

人乳好酒溫服泄瀉加丁香乾薑肉豆蔻

真人解毒湯 治痘母

忍冬花 八兩 甘草節 一兩 木通

荆芥 防風 連翹 各三錢

分三劑水酒各半煎以腫消痘出爲度

紫草飲 治痘瘡黑陷不起

紫草 芍藥 麻黃

當歸 甘草 各等分

水煎服

加味四聖散 治痘瘡黑陷倒陷

紫草 木通 木香

黃耆炙 川芎 甘草

人參各等分 蟬蛻十箇

糯米百粒水煎服

元參地黃湯 治痘疹衄血

元參 生地 丹皮

山梔 甘草 升麻各五分

白芍一錢 蒲黃炒五分

水煎服

神應膏 敷護防痘入目

黃栢 一兩 甘草 四兩

黃芩 荳粉 一兩 五錢

紅花 二兩

研細末 臘脂水同蜜調塗兩眶四畔痘上

麻黃湯 治痘疹初發熱而喘

麻黃 杏仁 甘草 各等分

石膏 加倍一方無石
膏有桑白皮

臘茶葉一錢煎服

清金散火湯 治痘疹初發熱而喘

麻黃 蘇葉 桔梗

牛蒡子 炒 甘草

水煎服如腹脹加厚朴大小便秘加炒葶藶子

粉撲法 治汗出太多不止

黃連 牡蠣粉 貝母 各五錢

粳米粉 一升

爲細末撲身上

敗蒲散 止汗

故蒲扇燒灰每服三錢溫酒調下無時服

秘傳復生散 治痘瘡黑陷不起發

珍珠

琥珀

雄黃

硃砂

穿山甲

兩頭尖

香附米

各一錢

真蟾酥

五錢人乳浸化

研細和勻一歲兒服八厘二三歲服一分二厘

用熟蜜水調下

安胎飲 治娠婦痘疹必用之方

實條芩

沉水者二錢

人參

當歸身

白朮

白芍

大腹皮

黑痘汁
浸酒洗

陳皮

川芎

紫蘇葉

各八分

砂仁

連壳炒
研

甘草

各五分

糯米一撮煎溫服

辰砂益元散

治痘熱毒太甚狂言燥渴欲飲水者

飛滑石

六兩

甘草末

一兩

飛辰砂

三錢

合勻每服一錢燈心湯下大人加倍

四順清涼飲

治裏熱證大便結

當歸

白芍

大黃

甘草

水煎服

臙脂塗法 治黑痘良方

先用升麻一味煎濃汁去渣將臙脂於湯內揉汁
就以本綿蘸湯於痘上拭之

痘疔門主論

嘉泰順曰夫疔者乃毒火鬱結腠理秘密發熱之後
先著其疔或三五粒或一兩點獨大色赤平匾而
濶出來必貫黃漿次日卽行收靨見必煩躁狂亂
辨認得真卽宜銀針挑破口含清水吸去惡血外
以雞冠血點之或以拔毒散敷之大用清涼發表
之劑痘方得出書云冷疔先見諸痘不敢彰形若
不早刺則毒火鬱結久則走黃遍身發腫痘來隱
隱不能出痂束手待斃悔無及矣醫者慎之

陳實功曰痘毒升發未盡留毒心肝二經發爲痘疔
初生紫點次日變黑浮高而潤者毒淺深陷而焦
者毒深其發多在七朝上下將靨之際生於靨腿
手足身溫疤潤聲清者吉發在肚腹腰腎身熱色
枯聲啞者凶凡遇此證急用針刺疔根插入蟾酥
條候四邊裂縫疔搖者用刀割去搽玉紅膏收口
如針刺無血插藥乾枯不變膿者終爲不吉但此
證屬有餘首尾但宜加減鼠粘子湯主之

正宗

痘疔門主方

加減鼠粘子湯

鼠粘子

知母

天花粉

山梔

荆

芥

各六分

甘

草

三分

竹葉燈心各二十四件水煎服

拔毒散

專治痘疔及賊痘紫薄萍等症如神

透明雄黃不拘多少研細再將滾水泡棉臙脂取
濃汁調點疔頂上

回聖丹

專點痘疔即刻回生

牛

黃一錢二分

兒

茶

一錢七分

硃

砂

八分

珍

珠

二分

乳細用口嚼臙脂調勻點之

珍珠膏

治痘不發必有痘疔黑而大臭者宜急點之

珍

珠

五顆

碗

豆

四十九粒

髮

灰

一錢

乳細用臙脂汁調膏撥疔點之黑疔即變紅活矣

痘疔

甘蔗揸晒乾真香油點燈燒成灰以津唾調勻銀簪挑破點上立效

又方

珍珠研末油胭脂調搽神效

痘癰門主論

喜泰順曰痘瘡發毒多見於外曆之證膿漿潰爛何由而足雖云變臭生意已成必發癰毒方爲穩兆發於四肢則傷手足發於頭頂硬處爲佳內服消風化毒湯外用生黃荳磨而敷之此險中得順十無一失也

邵慈菴曰凡有遲延日久而起不圓潤而曆既平之際又發癰腫人固知其餘毒而不知爲何經當辨之但氣高喘急胸滿肚壯者餘毒在肺也痰涎稠

粘口咬受齒泄瀉不止口臭者餘毒在脾胃也盜汗熱不退而渴者餘毒在心也夢中多驚餘毒在肝也耳聾尚熱餘毒在腎也眼合不開身腫不消內熱不清鬱悶不樂者餘毒諸經皆有矣

心法曰痘後餘毒發出小如李者爲毒大如桃者爲癰單生一個者毒在肌肉屬順易治連發數處者船小載重屬險若結於骨節之間或成對發出者其毒已盛潰破之後滲泄氣血不能斂口屬逆

陳實功曰痘癰卽是痘毒緣滯滯不足毒流於脾肺

二經致手脚胸背結成漫腫大如桃李此多發於
收靨之後身涼不渴者吉初起嚼生黃豆敷之自
消已成用太乙膏貼候膿熟針之元氣虛弱者保
元湯助脾健胃爲主 正宗

胡公弼曰痘癰宜大連翹飲主之大便秘加酒炒大
黃微利之如疹後風瘡加金銀花

寶漢卿曰發於面項胸脇者難治生四肢者易治

澄曰凡痘後發熱卽是餘毒未盡不會多服敗毒藥
防發痘毒宜仔細脫衣看視乘早消除

又曰發於關鍵要害處及氣血虧敗者險

又曰痘毒斷不可開刀

痘癰門主方

三豆丹 扁鵲

敷痘毒聖藥

黃豆

赤小豆

六一豆 各一合

用醋浸搗研濃漿時時以鷺翎掃上紅腫退去其效如神

三豆飲 扁鵲

凡遇時令不正宜預服此以疎解之

黃豆

赤小豆

綠豆

各一升

甘草節二兩

水煮熟食豆飲汁七日乃止永保無患

保元湯

痘癰出膿之後脾胃虛弱膿清不斂者服之

人參

白朮

黃芪

各一錢

甘草

三分

姜一片棗二枚煎食遠服

緜繭散

痘後餘毒流注各處出清水者

出緜繭不拘多少用生明礬末填滿煨灰乾摻

即毒即消丹 岐天師

人參二錢 金銀花五錢 甘草一錢 元參三錢

水二碗煎三分與小兒服之一劑即消大半二劑全愈付符一道焚在藥中煎汁神效凡服藥不效焚符於藥中煎藥與小兒飲之十人十生符式○///川一

咒曰小兒有病病魔作祟吾今施符治無不愈
吾奉

天師岐真君律令勅

書符前念咒一遍書畢又念咒一遍焚於藥內
又念咒一遍此秘訣也

歲久不愈神方 岐天師

黃芪 二兩 生甘草 二錢 白芥子 三錢 柴胡

肉桂 各五分 人參 白朮 當歸

金銀花 各一兩 薏苡仁 三兩

先將薏苡仁用水四碗煎汁二碗再煎前藥半
碗饑服一劑後用

黃芪 薏苡仁 金銀花 各一兩 白朮

當歸

各五錢

生甘草

白芥子

各二錢

陳皮

五分

水三碗煎半碗四劑全愈其服藥之時更須用

藥洗之

金銀花

一兩

甘

草

三錢

生

葱

三根

水二碗煎洗之

痘毒潰爛不愈

乾百合爲細末摻之數次即愈

痘毒

鴨肉蒸熟淡喫其毒自消

消痘毒

瑞香花葉全冰糖搗敷中留一孔透氣自消

消痘毒

糯稻草燒灰入箬箕內以滾水淋三遍取稻草浸

灰敷之自消

消痘毒

張綱如屢驗方

大蚌一個只取肉用黃土四圍封固火煨至紅只

取蚌肉存性研末油調敷立消

痘癰潰爛不愈

剝泥蛤蟆皮貼上即愈

痘毒

錢青榆

新瓦磨光洗淨置羯羊糞於瓦上上下下以瓦覆之
文武火炙燥烟盡存性取出爲末麻油調敷神效
痘後餘毒 丹方全集

人參

白茯苓

犀角

金銀花

各三錢

甘草

草

一錢五分

羚羊角

一錢

珍珠

八分
研

右爲末蜜丸每日服一錢白湯下日日服神效

解毒護童膏

陰陽文註證

金銀花一觔用水入銅器內煎至揼無苦味爲度
粉甘草四兩用水煎至無甜味爲度去揼二汁和
勻用文武火慢煎約十碗至三四碗入米白糖收
成膏埋土內一日出火氣每早以百沸湯沖一鍾
與小兒喫一切瘡毒不生併可稀痘若初出痘後
煎服此膏則遺毒皆盡勝多喫胡桃也

痘毒久不收功奇方

湯聘三

乾百合

參錢

血

竭

二錢

梅冰片

一分

共研極細末乾摻卽收功矣

移痘毒大毒法

凡毒發虛怯處骨節關鍵處出頭便難斂口可取
池塘綠苔敷在腫上留一空處或上或下卽移毒
於所空之處出頭池塘綠苔夏月浮在水面上冬月在水底泥上取

痘毒已潰

旱稻草根連土烘燥研極細摻之

痘毒初起

張太和

苦丁草伏龍肝全蜜調敷

痘後餘毒

生萊豆末

赤小豆末

白

蜜

各五錢

猪

油

叁錢

用馬齒莧汁一碗全藥淨鍋內熬成膏塗之

消痘毒

漱淨口將柿餅細嚼敷四圍卽消

痘毒久不收口

多年頭油鑊子放火上煨紅冷定乳細末搽上卽愈

消痘毒

熟黃牛屎加蚯蚓搗敷卽消

痘毒久不收功有多骨者

紅昇丹同人中白煨各等分研細搽上膏蓋多骨

自出收功

痘毒久不收功

鮮馬齒莧生搗極爛取汁服之以搗敷痘毒上腫

自消膿自乾口自歛

痘府門主論

痘府乃痘後餘毒未盡正氣已虧邪走空竅是以口
鼻眼耳前陰後陰皆可成府治當敗毒調元

痘疔門主方

驗方

牛糞尖

燒灰存性

雄

黃

各等分

每錢加水片二分乳細搽患處立愈

痘風瘡門主論

陳實功曰痘風瘡是痧痘後毒發未盡留熱肌膚後
被外風侵入其患先從細瘡作癢次漸沿開成片
脂水生痂搔之無度宜用麥餞散擦之 正宗

痘風瘡門主方

麥飯散

小兒痘風作癢叠叠成片甚則頑麻不知痛癢
小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內和硫黃四兩白
砒一兩研細待冷取起加烟膠半觔川椒三兩生
明礬枯礬各二兩共研細末臨用葱湯洗淨以麻
油調搽油紙蓋紮三日一換三次即愈並治白禿
神效

痘癢門主論

申斗垣曰痘出五七日後癢極動手抓破急用仙鶴
翎在痘上掃一二次即止癢就不抓此神驗秘方
也 啟玄

痘後癰跡不退門主論

申斗垣曰痘已愈毒未全解癰跡雖落盡止有癰痕尚在或黑或凸或凹或成瘡者用真白蜜一兩塗之其癰自滅啟玄

胡公弼曰羊骨髓入輕粉研勻塗之滅癰青囊

痘後瘡水不乾門主論

申斗垣曰痘後瘡水不乾在肢體名曰痘疔用出過
蛾的蠶繭不拘多少每個入生明礬令滿炭火煨
研爲末摻之即乾

版玄

又曰搔癢痘破爛者用多年屋上腐草不拘多少研
極細鋪在蓆子上令兒臥其上自不粘痛或摻之
亦妙

出痘後細瘡如疥難愈論

申斗垣曰夫痘四癰落宜該清潔或悞食發物或勤
拖風前致令復生細瘡似疥非疥最難得愈內宜
用川蜂蜜一二兩同水煎滾時時呷之外用懷孕
母豬的糞晒乾燒灰不拘多少加輕粉滑石各五
分研細酒調勻鵝翎掃搽卽愈

啟玄

精炮製用藥法

聶九吾曰凡用寒涼藥品除陽症傷寒熱積痢症及諸實熱等症外其餘若用之降炎上之火用之清血分之火俱有寒因熱用之義須依酒炒酒製之法最爲緊要同一寒藥也依法用之則取效不依法用之則爲害若痘瘡中前後所用解毒諸寒藥皆因毒火燥血而用入血分以涼血活血者是以芩連梔栢花粉大黃等味必用酒拌濕炒燥牛蒡子必炒香研碎當歸白芍生地紅花紫草牡丹皮

地骨皮之類必以酒臨時洗用此要法也而時醫
苟簡粗率每每不依法炒製而生用寒涼不惟無
益而反以致害者多矣此其失非小而人不知也
不惟病家莫之知而醫家亦竟不悟也儻悟其失
豈可省此微勞而貽此大害哉予故表而出之以
訓將來也製之大槩有熟者甘草黃耆白芍俱生
用虛寒者甘草炙熟黃耆蜜炙白芍酒炒

痧疹門

四方痧名各別

四方之方語不同其實皆疹也調治之法俱同避忌之說無異

東師內外名曰溫疹

河南名曰桴瘡

山西陝西名曰糠瘡

山左名曰疹子

江南浙江名曰痧疹

湖廣江西名曰痲疹又名崩子

福建廣東廣西雲南貴州四川俱名曰疹子

碎金賦

疹屬君火氣本少陰傳於其子兮故爲脾胃之證乘
於其妻兮現乎皮毛之分亦胎毒之所發因疫癘
而後成咳嗽噴嚏兮辛金煉於丁火頓悶泣出兮
君主御乎將軍將軍肝也迎而奪之分其鋒易挫隨而
擊之兮其銳難勝如折勾萌兮斧斤不用苟待燎
原兮玉石俱焚

其色如斑兮摸之有迹其形似痘兮視之無津朝出
暮收兮發之於陽暮出朝收兮發之於陰變化莫

測出沒靡定大抵愛赤而惡黑治者喜涼而忌溫
赤如點朱兮光明彰顯之象黑如灑墨兮火鬱熏
昧之甚制以酸涼兮收炎光於麗澤投以辛熱兮
縱赫曦於重明

敗毒防風開發斬關之將

人參敗毒散
防風通聖散

解毒連翹制

伏降虜之兵

黃連解毒湯
連翹飲

如錦爛熳兮服化斑而

艷欽

化斑湯

似火薰蒸兮飲涼膈而熱清

東垣涼膈散

咽

痛兮甘桔牛蒡止欬嗽更能潤肺

甘桔湯

溺澀兮導

赤芍藥定驚悸又可涼心

導赤散
名火府湯

便秘兮承氣

膽導

調元承氣湯
膽導法

便泄兮黃芩猪苓

黃芩芍藥湯
猪苓湯

大渴兮膈焦置瓜蒌於白虎

白虎湯

苦煩兮裏熱加

山梔於安神

安神丸

無伐天和兮使陰陽之適調勿

犯胃氣兮雖攻補之不盡

痘欲盡發而不留疹欲盡出而無病或邪氣之鬱遏

兮留而不去或正氣之損傷兮困而未伸毒歸五

臟變有四證毒歸脾胃兮泄瀉不止而變痢毒歸

心肝兮煩熱不退而發驚咳嗽久而血出兮毒歸

於肺牙齒爛而疳蝕兮毒歸於腎輕者從制以嚮

善平之有功重者拒敵而肆惡攻之不勝

熱不除者調元湯加麥冬知母作搗兮兼以抱龍溫

驚

琥珀抱龍丸
錢氏溫驚丸

欬不止者阿膠散

小阿膠散

加杏仁枳

實帶血兮專以補肺太平

錢氏補肺阿膠散
十藥神書太平丸

注下

兮異功猪苓澤瀉

錢氏異功散

虛滑者大作參苓

參苓白朮

散滯下兮異攻當歸芍藥休息者少與真人

真人養臟

湯惟有牙疳之病原呼走馬之名初息臭而腐肉

漸血出而穿齦內服地黃丸制其火怪

地黃丸

外擦

蚊蛤兮殺其蠶精

蚊蛤散

牙若脫落兮崩砂之狀可

畏聲若啞頃兮狐惑之證難明

應出不出兮發之初惺惺次通聖奪命大發而有效

惺惺散防風通聖散奪命丹應收不收兮解之初葛根次化癰

涼膈大解而最靈升麻葛根湯化癰湯色淡白兮爲

虛四物去川芎加紅花桂枝四物湯色紫黑兮血熱

化癰去人參加元參燒糞化癰湯奪命發癰疹之聖

丹奪命無價解疫癘之神無價散發不出而煩躁兮虞

不能瞋黑不變而譫妄兮食不及新熟蒸蒸兮色

赤痢滴滴兮氣惺羸瘦骨肉之脫癰癰神識之昏

喘急兮胸高肩聳疔爛兮漏腮缺唇休誇三世之
妙手難留一息之遊魂

豈不聞誤服湯丸兮不如勿藥又不見特犯禁忌兮
可以自省愛吃鹹酸兮咳嗽連綿而不已喜啖辛
燥兮火熱燔灼而不寧甘甜過而齒齲生冷多而
糞清雞乃生風之畜魚則動火之鱗雞魚貪而亂
食風火併而啟釁邪反滋甚兮爲癰疹而不息毒
反深入兮值疫癘而再經斯則疹之遺毒亦若痘
之餘證

欲決內傷須詳外證目常赤痛兮青童抱火鼻常軌
衄兮素女臥薪病牙齒以終身兮立武困於湯鑊
發癰癰而連年兮朱雀驚於燒林淩數短澁兮及
州都之遭火便溇垢蠱兮必倉廩之被焚哮喘炎
上之象丹瘤赤癰之形唇舌多瘡兮門戶殘烟未
熄咽喉常腫兮管籥餘燼猶存苟求其故兮則一
言之可盡欲撥其本兮豈一旦之能平噫此賦之
作效蛙之鳴詞雕鄙俚兮積如累石法則疹秘兮
故曰碎金

聶氏痧疹論 痧疹同

痧疹形如沙痘疹形如荳皆象其形而名之也痧痘俱胎毒而痘出五臟臟屬陰陰主閉藏其毒深而難散痧出六腑腑屬陽陽主發散其毒淺而易散臟陰多虛寒故痘可溫補腑陽多實熱故痧宜解散然痧雖屬腑而其熱毒之氣上蒸於肺肺主皮毛實受其毒是以發熱之初雖似傷寒而肺家見證獨多咳嗽噴嚏鼻流清涕眼胞腫眼淚汪溢面腫腮赤是也身體微汗潮潤則出最輕若氣喘鼻

乾作嘔驚狂者最重初見如疥如米尖再後成片
紅色者輕紫色者險黑色者逆不可視爲泛常不
可用藥失序又不可過爲攻表攻表太過則胃氣
受傷毒氣不能達反令停毒攻肺務宜辨寒熱虛
實察淺深而治之治之之法惟在宣發其毒以盡
出之於外雖紅腫之甚狀如漆瘡亦不足慮以其
既發於外卽可免內攻不若痘家之必顧其收結
也此症若調治得法十可十全而調治失宜則殺
人亦如反掌大抵初發熱時必當發表見形卽宜

清涼其用藥最忌酸斂溫補燥熱古云痧要清涼
痘要溫清涼者清肺熱也溫者溫補生漿也一種
初起眼白赤色聲啞唇腫作渴腰疼腹脹人事不
清口鼻出血煩亂狂叫不安此係閉塞不出名曰
閉症最爲難治服藥後若能現出者或可得生鼻
內流血者毒重口內出血者毒尤重初起手足心
如火熱非常者毒亦重若初時失於清解以致毒
蘊於胃口鼻出氣腥臭則生牙疳身熱不退餘毒
流入六腸則成痢症或過於發散後來元氣虛弱

骨瘦不堪則成疔疾種種壞症不可不慎此症日出三次三日九次爲順總宜出透毒氣得淨卽無他患又有一種奶痧風疹此類感風熱而出乃皮膚小疾服藥疎風清熱卽愈不在此痧症中論也正景痧疹有所大忌病家犯其所忌則至於殺人醫家犯其所忌亦至於殺人也其所忌不同皆忌閉塞其毒不得發洩也

朱純嘏曰易曰大哉乾元萬物資始又曰至哉坤元萬物資生資始者氣之始也資生者形之始也萬

物者合天地中之物而統言之也卽以人言之亦
天地中之一物也但人爲萬物之靈得天地陰陽
五行之正氣以生成因以得其所賦之理以爲健
順五常之德人雖天地中之一物而不與萬物同
其形而同其性也故三才之道合天地人而並言
之也人之有生受氣於父成形於母二五之類妙
合而凝乾道成男坤道成女在胎之中先有命門
則父精母血之毒藏於命門真且確矣外形則先
長鼻內如五臟六腑外如百骸九竅俱從逐日逐

月漸次生長惟命門凝成於有形之初則胎毒亦蘊蓄於有形之始命門人身之太極也陰陽五行包裹於命門之中痘與疹胎毒之陰陽也胎毒藏於命門無聲臭之可覓必俟外感痘之氣發出而爲痘外感疹之氣發出而爲疹何世人不推本求源而乃隨聲附和曰痘出五臟疹出六腑歷今千百餘年誰辨其非予不得已特表而出之曰痘與疹俱出命門或曰痘出五臟疹出六腑前人著書立說極其詳悉歷今千百餘年無有議其非者今

予一旦遽云痘與疹俱出命門豈不好奇涉怪借此至微至隱之形指此至精至密之理無可端倪之臟腑莫可測度之命門而言前此之非是不亦私相悖謬乎誠恐今之議者烏知後人之不議今乎予應之曰天下之物莫不有理惟於理有未窮故其物雖有定名有定理而不知有不盡也予所云疹與痘俱出於命門非無徵而敢云然也夫未出痘之先疹出多次俱不作正疹之數必俟大痘旣出之後或隔一兩月或隔半年一年或三五七

年之久遇正疹之時氣感而發之一出則不復出矣或又問曰子言胎毒藏於命門言之固深切著明也當出痘之時胎毒固發出而爲痘何不並發出而爲疹乎必待隔一兩月或半年一年之久而始出疹是胎毒在命門之中止隨痘之氣而出痘不隨痘之氣而出疹乎予曰正在此分陰陽五行也天以陰陽五行變化痘疹生焉人居氣化之中感痘氣而出痘感疹氣而出疹一定不易之理決無痘與疹同出之事或又問曰予著定論前言痘

有夾疹而出者今言痘與疹不同出何前後之紕繆若是乎予言痘至回水結痂之際復又身熱遍身上下通紅名蓋痘疹又名解毒疹今言出痘之後必俟隔一兩月或隔半年一年三五七年之久遇正疹之時氣感而發之一出則不復出是此回水結痂之際所出之疹作不得正疹乎予曰痘有夾疹之症當痘出之際發熱蒸蒸脾肺兩家風熱亦隨之而出現故不甚關利害止用黑參升麻湯一劑而疹自消散痘出亦輕若夫回水結痂之際

復又發熱遍身上下通紅細看痘粒膿漿充足此乃蓋痘解毒之疹也曰蓋痘者痘之上蓋一層疹也曰解毒者此疹一出可以解痘後之毒也宜用大連翹飲加煨石膏花粉淡竹葉各一錢以清解其餘熱此等症候蓋因灌漿之時痘必稠密極力用藥催漿過於補劑熱滯脾肺故出此疹予歷年久見症多透徹造化之機緘究竟精微之奧妙不敢私之家傳用以公之於同志者

又曰痘瘡形如痘痂疹形如麻皆象其形而名之也

昔人皆曰胎毒言之誠是蓋以出一次則不復出
其爲胎毒可知然又曰痘出五臟疹出六腑以訛
傳訛誰知有命門子於痘瘡論中言之極其詳矣
夫所謂胎毒者人於胚胎之初受氣於父成形於
母是父精母血之毒已凝聚於陽施陰受之始豈
待成胎之後慾火不節厚味不忌降生之頃嚙其
血而後有是毒也若以胎毒言之不論富貴貧賤
人人俱有然於中有輕清重濁之分是以出疹有
順險逆三等之別揆其因由天地有非常之氣陰

陽鼓舞卽有非常之令鼻聞其氣傳入於肺肺復傳於各臟漸次傳入命門夫然後五臟之邪氣內侵命門之胎毒外透正疹從此而發矣疹發而熱毒之氣上蒸於肺肺主皮毛實受其毒發熱之初雖似傷寒而肺家見症獨多咳嗽噴嚏鼻流清涕眼胞腫眼淚汪溢面腫腮赤口乾唇焦此所謂正疹由於胎毒者是也身有微汗滋滋潤潤氣不甚粗身不焦熱則疹出必輕若氣喘鼻乾更又鼻掀作嘔吐驚搐狂躁無汗者最重

凡疹初未見標之時先必身熱頭疼咳嗽或作吐作瀉或鼻塞鼻流清涕噴嚏眼肥腫腮赤煩躁不寧細看兩耳根下頸項連耳之間以及背脊之下至腰間必有三五紅點此乃疹之報標若無紅點之證佐當以別證論此屢試屢驗者也如果有紅點與前證相同宜用宜毒發表湯加芫荽爲引以托之外出不必拘泥吐瀉疹出而吐瀉自止蓋熱蒸胃則吐熱衝大腸則瀉此乃疹之常候不必憂其吐瀉之不止也昔人云疹出六腑或因有此症而

云然也統而言之胎毒藏於命門體也五臟用也
六腑又五臟之用也相須而生成也

凡出疹見標之後形似麻粒大粒而尖稀疎磊落再
後成片紅色滋潤者順若神清氣爽者更順若初
出一時湧出不分顆粒深紫色者險黑色者逆不
可視爲泛常不可用藥失序不可過用攻表不可
驟用寒涼調治之法避風忌葷兼忌穢污惟在用
藥宜發其毒以盡出之於外雖紅腫之甚狀如漆
瘡亦不足慮以其出之於外即可免夫內攻此症

若調治得法用藥合宜百不失一若調治失宜則殺人亦如反掌可不慎哉

初發熱時必當發表見標之後發表而兼清涼通身上下通紅總成一片手足之末上下相同無有空處此爲出透可用清涼解毒之劑不必兼用發表之藥一解卽愈

又有一種疹初出眼胞腫白夾赤色聲啞唇腫掀翻鼻乾鼻又掀氣喘口燥作渴腰疼腹脹人事昏沉口鼻出血煩亂狂叫二便出血此係毒氣鬱遏於

內名曰閉症最爲難治用宣毒發表湯內加酒炒
黃芩七分麻黃五分若能托疹標出外漸次出現
或可望生若不出現則無望矣但凡疹症鼻出血
者毒重口出血者毒尤重二便出血者毒更重且
又危矣初起手足心如火熱者毒重初起腳冷如
冰者毒更重

若初見疹標尚未出透失於清解誤用辛熱之劑以
致毒蘊於胃口鼻出氣腥臭必生牙疳宜用化毒
清肺湯加石膏二錢若已出透速收速散身熱不

退餘毒流注大腸裏急後重紅白相兼已成痢症
宜用清熱導滯湯

若其人素稟虛弱當出疹之際過於發散出透之後
過於寒涼解毒以致虛弱之極骨瘦神疲面無紅
色且又不能多食食多卽吐急用香砂六君子湯
去半夏加麥冬以補之種種壞證不可不慎

疹之出也出三日而始盡每日出二次子時出者已
時散午時出者亥時散經三日而出六次出透稠
密無縫方爲吉兆昔人有云痘喜稀疎疹宜稠密

雖如漆瘡通紅一片亦不足慮

若夫甫生一月及至半歲一歲之間時值天氣炎熱
或出姪疹痧疹風癰等疹不在正疹之列亦不由
於胎毒而致可以不必用藥其疹自散此類感風
熱而出及皮膚小疾常見出一次又出一次及有
連出不已者無關利害倘要用藥微用疏風清熱
之劑一服卽愈

凡出疹發熱三日見標者爲順遲至五六日不見標
者爲逆神氣清爽者爲順昏沉者爲逆病家知禁

忌者逆可以變順不知禁忌者順亦變逆業勿科
者當熟思之當於出疹之家明言之亦可見仁人
君子救人之心防於未然無所不至毋以此言爲
迂

當出疹之時必宜謹避風寒若不避忌風寒外束疹
卽收回要其再出甚爲難矣不可不慎

人之生兒育女當出疹之時各宜小心謹慎潔淨內
外勿使穢污氣息觸犯出疹要緊

凡小兒乳疹以及癰疹痧疹風熱等疹不在正疹之

列亦不由於胎毒此類感風熱而出及皮膚小疾
常見出一次又出一次及有連出不已者無大關
利害倘身熱不退可用荆防發表湯以散之如身
不熱
不必
用藥

凡正疹由於胎毒其出也必在出痘之後或隔兩三
年或隔半年一年之久甚至八九年之遠感正疹
之氣而出次後再不復出矣

有所謂溫疹者感於風熱由於胎毒又值時令疫癘
之氣城市傳染迅速異常調治乖張立刻變症予

每臨此症俱遵聶氏三方加減變化每獲奇效用
是以告後學若先出過正疹再不出溫疹

內廷訂方藥以十三味爲式可少決不可多如滿十
三味則將淡竹葉煨石膏入於藥引之內更覺妥
當

予每看疹相其時日聞氣聽聲觀形察色然後叅之
以脉始用宣毒發表湯表之繼以化毒清表湯清
之遵此二方加減逐日變化未透則前葛荆防爲
必用之藥既透則前葛荆防爲可去之劑氣喘除

升麻不用便秘蒸大黃必需疹色乾焦生地歸尾
要用若還紫黑紅花紫葺宜添咳嗽氣急清肺飲
解除肺熱口瘡口臭敗毒散清胃利咽成方在此
活法由人麻疹已出透用生犀角磨井水和藥同
服大能解毒

澄

曰壬午年溫疹大行老少男婦傳染死者盈萬予
惟以宣毒發表湯化毒清表湯去黃連加觀音柳
治之竟無死者其所以然者蓋此次痧疹乃時行
溫疹外寒收束初現只宜宣毒發表原不可驟用

苦寒無如咸執痧喜清涼見面卽用黃連水伏所以悉成痧閉而亡繼相延時日傳爲痧瘡喪命者不少醫者固不知驟用苦寒之悞而病家亦只知痧疹本凶不察苦寒所悞深可悲也凡我同志遇此疫癘傳染痧疹均當宜毒發表俟痧疹已齊再爲清表化毒庶不致成痧閉戕其性命也

疹有四大忌

一忌葷腥生冷風寒

出痧疹時大忌食葷腥食生冷冒犯風寒皆能使

皮膚閉塞毒氣抑鬱而內攻也

疹初出時以至出盡之日俱忌食葷腥卽素菜亦忌煎炒葢葷腥煎炒能助胃火昔人云葷痘素疹誠哉是言也

疹初出時以至透之日未免口渴煩躁想飲冷水不妨少飲些須以解其煩渴然不可多飲若欲再飲仍飲些須若土產有荸薺及有秋梨甜者並柿餅有霜者不妨間與食之雖生喫無妨切不可與粥及米湯糖餅糖飴麪食荔枝圓眼蜜餞之類食

之恐助毒火倘或餓極煮成粥以開水半大鍾著飯粕小半鍾和勻溫服俗云飽痧餓痘痧疹本不知餓也

當出疹之時必宜謹避風寒若不避忌風寒外束疹卽收回要其再出甚爲難矣慎之

一忌驟用寒涼

初發熱時最忌驟用寒涼以冰毒使毒氣抑遏不得出則成內攻之患而昔人謂天氣暄熱宜用辛涼發之如黃連解毒湯之類不知天時暑熱之氣

豈寒涼之藥所能解今驟用寒涼恐不足以解外熱而適足以阻內熱使不得出也

曾見一宦家艱子得一男甫一歲出痧發熱痧未見形而發搐醫誤爲急驚而用涼藥攻之遂令痧毒隱隱在皮下不出後醫以滋陰爲主而用四物等藥亦不能救煩悶聲啞至旬日而死此可以知涼藥冰毒之害矣今因天熱而驟用寒涼豈理也哉

當疹初出之時雖有身熱煩躁口渴等症卽以宣

毒發表湯少加酒炒黃芩三五分以清之切不可
遽投黃連黃柏梔仁等大寒之藥恐冰其毒而內
伏疹不得外出矣後雖設法宣表而疹終不得出
可不畏哉

一忌誤用辛熱

初發熱時最忌誤用辛熱以助毒如桂枝麻黃羌
活蒼朮丁香肉桂砂仁之類能使毒壅蔽而不得
出亦致內攻之患卽有痧麻初起四肢逆冷乃火
極似水之故不可妄投熱藥痧現自然漸和而昔

人謂天氣大寒只宜置之煨室謹避風寒可也且天氣雖寒而人身之熱毒未必減而多用辛熱豈理也哉

疹初出時或有嘔吐之症醫家必用蒼厚平胃丁香砂仁煖胃或手足稍冷必用桂枝肉桂溫其手足殊不知作嘔吐者火熱蒸於胃也今反以辛溫之味攻之是抱薪而救火至於手足稍作冷者熱極似寒之象俟疹出透而手足自溫醫不明此反以桂枝可達四肢之末肉桂可以溫經回陽誤之

又誤陷人性命可不畏哉

一忌用補澁

痧出之時多有自利不止者其毒亦因利而散此殊無妨如泄利過甚則以加味四苓散與之切忌用參朮訶藟補澁之藥以圖速止重則令腹脹喘滿而不可救輕則變爲休息痢纏綿不已也如痧後瀉黃紅色乃內有伏熱加木通車前子黃芩可也記之記之

痧疹多有利而不止者醫家全不細心參酌乃曰

吾於清解藥中兼用些參朮訶蔻分兩又少何碍
於事一服不見立效又曰分兩輕之故耳於是多
加分兩再服而疹或變症矣可不慎乎

若麻疹出盡之後瀉黃紅色乃內有伏熱仍宜加
味四苓散可也蓋兼用補瀝且不可專用補瀝又
可乎慎之

聶氏曰痧疹痘瘡險逆等證初時難以現形出不快

利如寒冬之月用芫荽

又名秀草

或紫蘇宜用砂器將

此種隔水煎煮室中取微微香氣能助發易現今

愚俗不明卽用煎水盈盆將小兒大洗大浴浴後
仍加衣被不但無益亦且有損反致熱氣內攻多
令小兒悶燥不安啞口難言況痧痘見形卽不當
下水知者慎之初起微微浴手足心或可取其內
外通達之意耳

朱氏曰芫荇乃透麻疹之聖藥也生取來連根帶葉
搗爛約有三錢入於磁碗內用滾水半鍾滾白酒
半鍾同入碗內泡少頃其味自出通口服之痧出
更快若無芫荇苗葉用子研服亦可再加白芝蔴

同研服更妙窮鄉僻壤用此可當明醫屢試屢驗
觀音柳一名西河柳乃小兒痧疹之聖藥也冬月用
枝梗春夏取苗葉每用一錢煎湯服年力大者多
服一次無妨能清脾解毒發表若在窮鄉僻壤醫
藥不便煎服疹卽出現

聶氏曰小兒痧痘初起近來多服筭湯意圖發表不
知止可少煎用使引透肌膚取其易出若過用失
宜反令元氣受傷脾氣虧損不能消化毒氣以致
乾嘔泄瀉出汗心煩灌漿時每有破爛濕痒口瘡

等患藥內引用笋尖尤其所忌特指明爲習弊用
笋湯之戒

朱氏曰冬笋尖南醫用以催痘長漿北醫習而不察
俱於痘長漿時用作藥引殊不知冬笋非上林之
笋也至春二三月自死於土中冬月人取爲美饌
今南人又不察物理更於表疹藥中又用笋尖作
引若春笋雖生長上林在疹門亦不可用恐其氣
味傷泄元氣冬笋乃死氣隨之安可用乎

孫氏曰痧疹前後病眼赤紅者當用生地菊花決明

子疾藜歸尾柴胡紅花等味皆可隨證加減

又曰痧後面色青白骨瘦不堪元氣損傷肝脾血少
成疳眼懶睜長明似害非害宜服健脾肥兒丸或
服八珍湯六味地黃湯九庶可漸愈如清火疎風
一切治眼之藥萬不可妄投不但痧後如此凡小
兒病後失調成疳疾痞眼者俱當如此醫治養血
健脾爲主儻大便瀉泄稀水白色者歸脾湯補中
益氣湯皆對證要藥也

澄

曰凡服痧疹煎劑無論男婦小兒每一劑藥煎

可分兩三次服之庶藥力輕徐不致升散過急一
湧而出也

痧疹門主方

宣毒發表湯 初發熱欲出未出時用

升麻

白粉葛

防風

去蘆

桔梗

各五分

荆芥

薄荷

甘草

各三分

牛蒡子

炒香研細

連翹

去心蒂研碎

前胡

枳殼

炒

木通

淡竹葉

各六分

白水煎

天氣大熱加黃芩

炒八分

大寒加麻

黃

蜜炒八分

解毒快斑湯

痧瘰已見形一二日內宜服

連翹

荆芥

各七分

牛蒡子

研破

當歸尾

防風

各六分

蟬

蛻

五箇

生地

山查肉

各二錢

黃芩

酒炒

桔梗

乾葛

紫草

各八分

川芎

五分

觀音柳二三分爲引不可多用

化毒清表湯

痧疹已出而水腫大甚宜用

牛蒡子

連翹

天花粉

黃連

地骨皮

黃芩

山

梔炒

知母

乾葛

元

參各八分

桔梗

前胡

木

通各六分

甘草

薄荷

防

風各三分

口渴加麥門冬

去心一錢

白石膏

煨研三錢

大便秘加大黃

酒炒一錢二分

朱氏加

燈心五十寸生犀角三分

清肺飲

痧證四五六日圓時尚有餘毒留於肺胃咳嗽氣粗外熱不退者

石膏

生

地

各二錢

麥門冬

元參 各一錢

桔梗

黃芩

當歸尾

知母 各八分

柴胡

陳皮

各六分

甘草

五分

殭蠶

五條

加竹葉三片煎

調元健脾保肺湯

痧痲後面色青白唇淡氣弱並治痧後瘦弱成疳疾

人參

白茯苓

沙參

牡丹皮

陳皮

熟黃芩

白芍

酒炒

麥門冬

當歸

薏苡仁

百合

炙甘草

如大便不實瀉白色者可加木香白朮訶子少許如瀉黃色加酒炒黃芩車前子

清熱導滯湯 痧癰毒氣流注而成痢者

黃連 條 芩 白芍

枳殼炒 山楂肉各一錢 厚樸去皮薑汁炒

青皮 檳榔各六分 當歸

甘草 牛蒡子 連翹各五分

紅多者加紅花三分地榆五分

秘澁甚者加酒炒大黃一錢二分

清胃散毒湯 治痧後口瘡牙疳等患

牡丹皮 桑皮 金銀花

甘草 生地黄 黃柏 蜜水炒

連翹心 沙參 白茯苓

僵蠶

如體虛加白朮

救苦散 治痧後口瘡牙疳

人中白 煨五錢 白僵蠶 一錢五 寒水石 井水飛

青黛 飛五分 冰片 一分 牛黃 二分

共為細末先以苦茶拭過隨搽患處

二聖散 痧疹咽喉腫痛不拘初起回後

白殭蠶 二錢
苦參 三錢

乳細吹之

和中湯 有一怪症大吐大瀉而後見者甚輕與作惡心乾嘔者不同用藥微表和中安胃為主

白朮 米泔水浸炒
乾葛 各八分
當歸身

白茯苓
桔梗 各七分
白芍 酒炒

甘草
半夏
柴胡

防風 各六分
陳皮
牡丹皮 各五分

生薑一片紅棗二枚爲引

加味逍遙散

有一種病後瘦弱唇白氣虛感時氣出痧疹或體虛痧出白色少紅活者

白朮

米泔水浸炒

蘇薄荷

陳皮

白茯苓

白芍

酒炒

麥門冬

柴胡

當歸身

甘草

牡丹皮

乾葛

白水煎

犀角解毒化痰清火丸

痧疹證咳嗽氣喘唇紅結熱在內煩躁不安或口鼻出血

者

生犀角

紫草

連翹心

花粉

牡丹皮

薄荷

甘草稍

川貝母

黃連

牛蒡子

各三錢

生地黄

二兩

當歸尾

八錢

赤芍

六錢

共為細末煉蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯服

健脾胃兒丸

痧疹

後失調體瘦氣虛或成疳疾或泄瀉

人參

橘紅

廣皮

各五錢

黃耆

蜜炙

白扁豆

炒

白朮

米湯浸炒

山藥

白茯苓

各一兩

當歸

白合

各八錢

白芍

酒炒

地骨皮

甘草

各六錢

川黃連

炒三錢

山查肉

神

麴

炒各二兩

磨細煉蜜丸彈子大每食遠白湯調服

天真膏

痧疹後咳嗽內熱不調心神慌亂夜臥不安

白朮

米湯浸炒

生地黄

元參

生黃芪

知母

麥門冬

去心

沙參

生薏仁

桑皮

各四兩

白茯苓

當歸

白茯神

橘紅

牡丹皮

紫苑

棗

仁炒各二兩

取長流水用砂鍋桑柴文武火熬成珠用上好白蜜收成盛淨器內每服三五茶匙白滾水調服

防風發表湯

初起發熱未見時二三日或四五日內或係奶疹風疹皆宜用此疏風清熱

防風

川芎

甘草

各五分

山查肉

二錢

乾葛

桔梗

各八分

枳殼炒七分

蘇梗

荆芥

當歸

陳皮各六分

紅花三分

杏

仁去皮尖炒一錢

白水煎如冬月天寒加羌活或蜜炒麻黃引用

細葱白半寸

朱氏曰可去陳皮加牛蒡子七分連翹五分夏

月炎熱可加炒黃芩五分如小便黃澀可加木

通七分

孟氏介石募施治痧神方

凡遇痧疹不拘四時皆可煎服藥味分兩萬勿增損

石膏煨二兩 當歸尾 乾葛

桑白皮各一兩 荆芥 地骨皮

桔梗各八錢 牛蒡子 赤芍

陳皮 薄荷各五錢 枳殼六錢

川貝母 甘草各四錢 紅花三錢

共爲細末每次用末三五錢白水三鍾煎湯濾去渣服輕者三五服重者六七服立愈照方施濟功德無窮大能起發透表解毒清熱不傷元氣是以功有神效并表藥性於左

石膏味辛色白達表淡而利竅煨用即純痧症
要藥清涼解毒用以爲君陳皮枳殼桔梗疎氣
治肺熱桑皮潤肺止喘清火化痰紅花歸尾赤
芍藥味辛治肺經血熱血活則毒散牛蒡子解毒
發癰疹乾葛味辛發表解渴透肌薄荷清肺胃
間熱通氣舒毛孔地骨皮解肺毒消熱燥甘草
解毒和藥荊芥散血分之風熱能開毛孔貝母
味辛化痰解毒

朱氏曰予見去桑皮不用可加前胡一兩防風
八錢酒炒黃芩八錢連翹五錢